

LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT

DIPROSALIC®

Dipropionate de bétaméthasone et acide salicylique lotion
Dipropionate de bétaméthasone et acide salicylique pommade

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à utiliser **DIPROSALIC®** et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état de santé et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **DIPROSALIC®**.

Pour quoi DIPROSALIC® est-il utilisé?

- **DIPROSALIC®** est utilisé pour traiter les problèmes persistants de la peau, là où le dessus de la peau est recouvert d'une couche de squames. **DIPROSALIC®** élimine la couche de squames et diminue l'enflure, la rougeur et les démangeaisons causées par votre problème de peau.

Comment DIPROSALIC® agit-il?

DIPROSALIC est une association de deux médicaments, le dipropionate de bétaméthasone et l'acide salicylique.

- L'acide salicylique agit sur la surface de la peau en ramollissant la couche supérieure de squames. Cela permet au deuxième médicament de pénétrer sous la peau affectée et de favoriser sa guérison.
- Le dipropionate de bétaméthasone réduit l'enflure, la rougeur et les démangeaisons de votre peau.

Quels sont les ingrédients de DIPROSALIC®?

Ingrédients médicinaux : dipropionate de bétaméthasone, acide salicylique.

Ingrédients non médicinaux :

Lotion : édétate disodique, méthylcellulose d'hydroxypropyl, alcool isopropylique, eau et hydroxyde de sodium.

Pommade : huile minérale et gelée de pétrole blanche.

DIPROSALIC® est offert sous les formes posologiques qui suivent :

Lotion : flacons compressibles en plastique de 60 mL

Pommade : tubes de 50 g

N'utilisez pas DIPROSALIC® si vous :

- êtes allergique au dipropionate de bétaméthasone, à l'acide salicylique ou à tout autre ingrédient de **DIPROSALIC®**;

- souffrez d'une infection comme la variole (vaccine), la varicelle, de feux sauvages (herpès labial) ou d'herpès génital (virus de l'herpès simple), d'une infection fongique ou d'une infection cutanée (tuberculose cutanée).

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser DIPROSALIC[®], afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. On ignore si DIPROSALIC[®] peut être nocif pour le bébé à naître. Votre professionnel de la santé décidera si les bienfaits de DIPROSALIC[®] emportent sur les risques potentiels pour le bébé à naître;
- si vous allaitez ou prévoyez le faire. On ignore si DIPROSALIC[®] passe dans le lait maternel. Votre professionnel de la santé décidera si vous devez cesser d'allaiter ou cesser d'utiliser DIPROSALIC[®];
- si vous souffrez d'une infection;
- si vous souffrez de maladies de la peau causées par une mauvaise circulation sanguine, par exemple une dermatite de stase.

Autres mises en garde à connaître :

- Évitez d'appliquer DIPROSALIC[®] sur la région génitale.
- Évitez d'appliquer la pommade dans les yeux, la bouche, les oreilles et le nez.
- Chez l'enfant, limitez l'utilisation de DIPROSALIC[®] à la quantité minimale requise. L'utilisation à long terme de ce médicament pourrait avoir des répercussions sur les hormones de votre enfant et, ultimement, nuire à sa croissance et à son développement.

Yeux :

- Évitez d'utiliser DIPROSALIC[®] dans les yeux ou près des yeux.
- Parlez à votre professionnel de la santé si vous présentez :
 - une vision brouillée;
 - d'autres problèmes de vision.

Peau :

- Ne recouvrez pas le médicament d'un bandage ni d'un pansement adhésif.
- N'utilisez pas de quantités excessives de DIPROSALIC[®] sur de grandes surfaces corporelles.
- Parlez à votre professionnel de la santé si vous présentez :
 - une irritation;
 - une peau sensible;
 - une peau extrêmement sèche;
 - une desquamation non voulue;
 - une peau qui pèle;
 - des vergetures (stries).

Ces symptômes peuvent survenir lorsque vous utilisez un corticostéroïde pendant une période prolongée. Vous devrez peut-être cesser le traitement.

L'utilisation de DIPROSALIC® sur de grandes surfaces affectées de la peau peut :

- réduire la production d'hormones;
- causer une enflure du visage (faciès lunaire);
- ralentir la croissance.

Conduite de véhicule et utilisation de machines : Après avoir appliqué DIPROSALIC®, attendez un certain temps pour voir comment vous vous sentez avant de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine.

Avisez votre professionnel de la santé de tous les autres médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sans ordonnance, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine complémentaire.

Comment prendre DIPROSALIC® :

Lotion : Une fine couche doit être appliquée deux fois par jour sur les régions affectées du cuir chevelu. Appliquer la lotion de façon à couvrir toute la région affectée.

Pommade : Une fine couche doit être appliquée deux fois par jour, le matin et le soir, sur la région affectée. Masser légèrement pour faire pénétrer entièrement dans la peau. La pommade doit couvrir toute la région affectée.

Si vous n'observez aucune amélioration après quelques jours ou une semaine, vous devez cesser d'utiliser DIPROSALIC® et consulter votre professionnel de la santé.

Surdosage :

Si vous croyez avoir appliqué trop de DIPROSALIC®, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes.

Dose oubliée

Si vous oubliez une application de ce médicament, reprenez le traitement à la dose suivante prévue. N'appliquez pas le médicament plus d'une fois au même moment.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à DIPROSALIC®?

En utilisant DIPROSALIC®, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que ceux qui figurent dans cette liste. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Des problèmes cutanés locaux ont été signalés lors de l'application de corticostéroïdes topiques. Les effets secondaires suivants ont été signalés :

- Sensation de brûlure
- Démangeaisons

- Irritation
- Sécheresse
- Enflure des follicules pileux
- Croissance excessive des cheveux
- Éruption d'acné causant une rougeur et un rougissement de la peau
- Plaques de peau plus pâle
- Éruption cutanée autour de la bouche
- Éruption cutanée rouge et accompagnée de démangeaisons causée par :
 - un contact direct avec une substance donnée;
 - une réaction allergique à la substance.

Il ne faut pas recouvrir DIPROSALIC[®] d'un pansement adhésif ni d'un bandage. Les effets secondaires suivants peuvent se produire plus souvent si un pansement adhésif ou un bandage est utilisé :

- Ramollissement et altération de la peau
- Nouvelle infection après le traitement (infection secondaire)
- Amincissement de la peau (atrophie de la peau)
- Vergetures
- Boutons de chaleur

L'acide salicylique, un ingrédient contenu dans DIPROSALIC[®], peut causer les effets secondaires suivants :

- rougeur locale de la peau;
- desquamation (peau qui pèle);
- démangeaisons;
- picotements et douleur vive.

L'utilisation en continue de produits à base d'acide salicylique sur la peau peut causer de l'eczéma. Il existe également un risque d'allergie à l'acide salicylique.

Des cas de vision brouillée ont également été rapportés avec l'utilisation de corticostéroïdes topiques.

Si vous présentez un symptôme ou un effet indésirable qui n'a pas été mentionné dans ce dépliant ou qui vous empêche d'effectuer vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associés avec l'utilisation d'un produit de santé à Santé Canada en :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur; ou
- Téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Entreposage :

Conservez entre 15 °C et 30 °C. Gardez à l'abri de la lumière.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir davantage au sujet de DIPROSALIC[®], vous pouvez :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit complète rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements pour le patient sur le médicament. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html>), le site Web de Organon Canada, www.organon.ca, ou en téléphonant chez Organon Canada au 1-844-820-5468.

Ce dépliant a été rédigé par Organon Canada Inc.

Dernière révision : le 15 avril 2021

® N.V. Organon, utilisée sous licence.

© 2021 Organon Canada Inc. Tous droits réservés.