

ORGALUTRAN®
Fertigspritze



Kurzanleitung zur Handhabung
– zur Abgabe an Ihre Anwenderinnen –

Die ORGALUTRAN® Fertigspritze

BESTANDTEILE DER FERTIGSPRITZE



Ihre ORGALUTRAN® Packung enthält:

entweder

- 1x Fertigspritze mit ORGALUTRAN® 0,25mg/0,5ml Injektionslösung
- oder
- 5x Fertigspritze mit ORGALUTRAN® 0,25mg/0,5ml Injektionslösung

So wenden Sie die Fertigspritze richtig an

ANWENDUNG DER FERTIGSPRITZE

1 Vorbereitung der Injektion



- Kontrollieren Sie die Lösung vor Gebrauch. Verwenden Sie sie nicht, wenn die Lösung Teilchen enthält oder nicht klar ist.
- Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und Wasser.
- Wischen Sie die Injektionsstelle mit einem Desinfektionsmittel (z. B. Alkohol) ab, um Bakterien von der Hautoberfläche zu entfernen. Als Injektionsstelle sind vorzugsweise die Oberseiten der Oberschenkel geeignet.
- Entfernen Sie den Nadelschutz vorsichtig.



2 Anwendung



- Nehmen Sie eine große Hautfläche zwischen Daumen und Finger. Die Nadel soll in einem 45°-Winkel zur Hautoberfläche in die eingeklemmte Haut eingestochen werden.
- Ziehen Sie den Kolben leicht zurück, um zu überprüfen, ob die Nadel richtig positioniert ist. Wird dabei Blut in die Spritze aufgezogen, injizieren Sie das Arzneimittel nicht, sondern ziehen Sie die Fertigspritze heraus und drücken mit einem Desinfektionstupfer auf die Injektionsstelle; die Blutung sollte innerhalb von 1 oder 2 Minuten zum Stillstand kommen.
- Wiederholen Sie den Vorgang mit einer neuen Fertigspritze.
- Sobald die Nadel richtig positioniert ist, drücken Sie den Kolben langsam und gleichmäßig herunter.

3 Entfernen der Spritze

- Ziehen Sie die Spritze rasch heraus und drücken Sie einen Desinfektionstupfer auf die Injektionsstelle. Benutzen Sie die Fertigspritze nur einmal.

Häufig gestellte Fragen

ORGALUTRAN® FERTIGSPRITZE

- **Hat die Fertigspritze ein Verfalldatum?**

Ja, dieses ist auf dem Etikett und auf dem Umkarton angegeben. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Nach dem angegebenen Verfalldatum darf das Arzneimittel nicht mehr verwendet werden.

- **Wie muss die Fertigspritze aufbewahrt werden?**

Frieren Sie die Fertigspritze nicht ein und bewahren Sie sie in der Originalverpackung auf, um sie vor Licht zu schützen.

- **In welchem Zeitabstand muss ich ORGALUTRAN® injizieren?**

Das Arzneimittel sollte einmal täglich injiziert werden. Die Zeitspanne zwischen zwei Anwendungen bzw. zwischen der letzten ORGALUTRAN® Injektion und der Injektion zur Auslösung des Eisprungs sollte 30 Stunden nicht überschreiten.

- **Wie lange soll ich die Injektionen durchführen?**

Bei morgendlicher Injektion sollte die Behandlung bis einschließlich des Tages der Injektion zur Auslösung des Eisprungs fortgeführt werden.

Bei der Anwendung am Nachmittag sollte die letzte ORGALUTRAN® Injektion am Nachmittag vor dem Tag der Auslösung gegeben werden.

- **Was ist zu beachten, wenn ich bei der Überprüfung der Nadelposition Blut an der Injektionsstelle ziehe?**

Injizieren Sie das Arzneimittel nicht, sondern ziehen Sie die Fertigspritze aus der Haut heraus und drücken mit einem Desinfektionstupfer auf die Injektionsstelle; die Blutung sollte innerhalb von 1 oder 2 Minuten zum Stillstand kommen. Nehmen Sie eine neue Fertigspritze und wiederholen Sie die Injektion.

- **Wie soll ich die Fertigspritze entsorgen?**

Fragen Sie Ihren Apotheker bzw. Ihre Apothekerin, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist. Entsorgen Sie das Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall.

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Gebrauchsinformation, die Ihrer ORGALUTRAN®
Packung beiliegt, sorgfältig durch und fragen Sie
Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker
bzw. Ihre Apothekerin.**



Infocenter

Organon Healthcare GmbH
Neuturmstraße 5
D-80331 München

Tel.: 0800 3384 726

Fax: 0800 3384 726-0

E-Mail: dpoc.germany@organon.com

DE-XGL-110000